

Semaglutida

Sobrepeso

Tratamiento especializado

Inyectable semanal

GIP + GLP-1

Perfil: Sobrepeso (IMC 27–29.9)



FASE 1 IDENTIFICACIÓN : ¿Para que sirve en tu caso?

Tu perfil: Obesidad mórbida (IMC \geq 40)

En sobrepeso, semaglutida no se prescribe únicamente por el peso. Para este IMC, la indicación clínica requiere que exista al menos una condición de salud asociada. El objetivo principal no es solo perder kilos, sino reducir el riesgo metabólico y cardiovascular. El tratamiento es más corto que en perfiles de obesidad y tiene la mayor probabilidad de suspensión completa entre todos los perfiles con indicación clínica.

⚠ Este perfil requiere supervisión médica

Pérdida de peso

Meta aproximada: 6–10%

Salud metabólica

Mejora glucosa y lípidos

Calidad de vida

Protección cardiovascular

Resultados típicos en sobrepeso

6–10%

Pérdida de peso con adherencia total

12–16

Semanas para resultados significativos

0.5–1 mg

Dosis de mantenimiento objetivo

En este perfil los resultados dependen fuertemente de los cambios de hábitos. El medicamento potencia, pero no sustituye la alimentación ni el ejercicio.

FASE 2: TRATAMIENTO DETALLADO

[CLICK AQUÍ PARA CONOCER TU TRATAMIENTO](#)

FASE 3: MANTENIMIENTO: Para cuando llegaste a tu peso ideal

¿Qué pasa cuando llegaste a tu meta?

En sobrepeso el objetivo es alcanzar la meta, consolidar hábitos y suspender gradualmente. Este perfil tiene la mayor probabilidad de suspensión completa entre todos los perfiles con indicación clínica

Por qué no se suspende de golpe?

En sobrepeso con condición asociada controlada, el objetivo del tratamiento es temporal: ayudarte a alcanzar un peso saludable mientras construyes hábitos sólidos. Una vez logrado y con la condición asociada bajo control, la meta es retirarlo de forma gradual. Gracias a que las dosis en este perfil son menores, la reducción es más rápida y mejor tolerada. Tiempo total estimado: 5 a 8 meses.

La decisión de suspender siempre es del médico. No lo hagas por tu cuenta aunque te sientas bien.

Esquema de mantenimiento orientativo

Meta alcanzada → 4 sem

Mantener dosis actual

Semanas 5-8

Reducir a 0.5 mg

Semanas 9-12

Reducir a 0.25 mg

Semana 13+

Suspensión bajo criterio médico

El proceso completo de reducción hasta suspensión toma aproximadamente 3 meses adicionales tras alcanzar la meta. Tratamiento total estimado: 5 a 8 meses.

Si después de suspender recuperas más de 2 kg en un mes, tu médico puede evaluar retomar 0.25 mg temporalmente. No esperes a que el rebote avance.

Semaglutida

Todo lo que necesitas saber para usarlo de forma segura

Inyectable semanal

GIP + GLP-1



1 ¿Para que sirve?



Controla el azúcar



Reduce el peso



Protege el corazón

No es insulina ni suplemento, trabaja con tu cuerpo para regular el azúcar el apetito y perder peso.

2 Esquema de dosis semanal.

Semanas 1-4

0.25 mg

Semanas 5-8

0.5 mg

Semanas 9-12

1 mg

Semana 13 +

1.7 mg

Semana 13 +

2.4 mg (mantimiento)

Espera mínimo 4 semanas entre cada aumento. No te saltes este tiempo.

3 Cómo preparar y aplicar tu inyección.

Tu kit incluye: Frasco 1 (polvo blanco) + Frasco 2 (líquido disolvente).

1

Revisa el frasco

Una vez abierto deberá refrigerarse

2

Revisa el polvo

Debe ser blanco o blanquecino, sin grumos ni partículas.

3

Transfiere el líquido

Con la jeringa, pasa todo el líquido del frasco 2 al frasco 1.

4

Disuelve suavemente

Gira el frasco hasta disolver, ¡NUNCA AGITES!

5

Verifica la solución

Debe ser transparente y sin color. Si está turbia, deséchala.

6

Aplicación

Aplica de inmediato o refrigera (2-8 °C) máximo 24 h.

¿Olvidaste aplicártela? Tienes 4 días. Si pasó más tiempo, omite esa dosis y continúa normal la próxima semana.

4 Cómo guardar tu medicamento.

Tiempo de vida

Hasta 30 días a ≤30 °C... o en refrigeración.

Ya preparado

Úsalo de inmediato o refrigera máximo 24 h. Después deshecha.

Seguridad

Fuera del alcance de niños. No usar después de la fecha de caducidad.

5 Efectos secundarios.

Comunes y leves

- Náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento.
- Dolor de estómago, acidez o eructos.
- Pérdida de apetito.
- Rojez o comezón en el sitio de la inyección.

Llama a tu médico si...

- Dolor fuerte en estómago o espalda.
- Bulto en el cuello o dificultad para tragar.
- Temblor, sudoración o hinchazón.
- Dolor de la vesícula y fiebre.

6 Qué evitar durante el tratamiento

No tomes alcohol en exceso porque aumenta el riesgo de azúcar baja.

No te automediques con otros tratamientos.

No conduzcas si sientes mareo o debilidad.

No usar durante el embarazo, cirugía de cualquier tipo o complicaciones médicas.