

Retatrutida


Obesidad

Tratamiento especializado

Inyectable semanal

GLP -1 + GIP + Glucagón

Perfil: Obesidad



FASE 1 IDENTIFICACIÓN : ¿Para que sirve en tu caso?

Tu perfil: Obesidad (IMC 30–39.9)

La Retatrutida es el agonista más potente disponible actualmente en investigación para pérdida de peso. En obesidad, este triple mecanismo produce pérdidas de peso significativamente mayores que los otros activos, con resultados documentados en ensayos clínicos de hasta 22% del peso corporal en este perfil.

Pérdida de peso

Meta: 18-22%

Salud metabólica

Mayor quema sin actividad física

Metabolismo

Control de glucosa y lípidos

Resultados típicos en sobrepeso

18-22%

Reducción de grasa corporal estimada

24-32

Semanas para notar cambios en composición

8-12 mg

Rango de dosis orientativo en este perfil

⚠ Los resultados varían según riesgos asociados, adherencia y apoyo multidisciplinario. La paciencia y constancia son fundamentales.

FASE 2: TRATAMIENTO DETALLADO

[CLICK AQUÍ PARA CONOCER TU TRATAMIENTO](#)

FASE 3: MANTENIMIENTO: Para cuando llegaste a tu peso ideal

¿Qué pasa cuando llegaste a tu meta?

En obesidad hay dos caminos posibles:

- Mantenerte en dosis baja de forma prolongada.
- Suspender gradualmente si consolidaste hábitos sólidos.

Suspensión: la meta más alcanzable de todos los perfiles

Dado el potente mecanismo de retatrutida, la suspensión repentina puede provocar un aumento de peso más rápida que con otros activos. La reducción debe ser gradual, no abrupta.

La dosis de mantenimiento la decide tu médico según tu respuesta individual. La siguiente tabla es orientativa, no un protocolo fijo.

Meta alcanzada → 4 sem	Mantener dosis actual
Semanas 5-8	Reducir a 8 mg
Semanas 9-16	Reducir a 4 mg
semanas 17-24	Reducir a 2 mg
Semana 25+ (opcional)	Bajo criterio

Tiempo total de reducción hasta suspensión: aproximadamente 4 meses. El proceso más corto de todos los perfiles.

Señales de alerta de rebote

Recuperar más de 3 kg en 2 semanas sin causa aparente, aumento de hambre intensa repentina, o retorno de antojos compulsivos.

Contacta a tu médico.

Retatrutida

Todo lo que necesitas saber para usarlo de forma segura

Inyectable semanal

GIP + GLP-1



1 ¿Para que sirve?

Controla el azúcar

Reduce el peso

Protege el corazón

No es insulina ni suplemento, trabaja con tu cuerpo para regular el azúcar el apetito y perder peso.

2 Esquema de dosis semanal.

Semanas 1-4

0.25 mg

Semanas 5-8

0.5 mg

Semanas 9-12

1 mg

Semana 13 +

1.7 mg

Semana 13 +

2.4 mg (mantimiento)

Espera mínimo 4 semanas entre cada aumento. No te saltes este tiempo.

3 Cómo preparar y aplicar tu inyección.

Tu kit incluye: Frasco 1 (polvo blanco) + Frasco 2 (líquido disolvente).

1 Revisa el frasco

Una vez abierto deberá refrigerarse

2 Revisa el polvo

Debe ser blanco o blanquecino, sin grumos ni partículas.

3 Transfiere el líquido

Con la jeringa, pasa todo el líquido del frasco 2 al frasco 1.

4 Disuelve suavemente

Gira el frasco hasta disolver, ¡NUNCA AGITES!

5 Verifica la solución

Debe ser transparente y sin color. Si está turbia, deséchala.

6 Aplicación

Aplica de inmediato

¿Olvidaste aplicártela? Tienes 4 días. Si pasó más tiempo, omite esa dosis y continúa normal la próxima semana.

4 Cómo guardar tu medicamento.

Tiempo de vida

Hasta 30 días a $\leq 30^{\circ}\text{C}$... o en refrigeración.

Ya preparado

Úsalo de inmediato o refrigera máximo 24 h. Después deshecha.

Seguridad

Fuera del alcance de niños. No usar después de la fecha de caducidad.

5 Efectos secundarios.

Comunes y leves

- Náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento.
- Dolor de estómago, acidez o eructos.
- Pérdida de apetito.
- Rojez o comezón en el sitio de la inyección.

Llama a tu médico si...

- Dolor fuerte en estómago o espalda.
- Bulto en el cuello o dificultad para tragar.
- Temblor, sudoración o hinchazón.
- Dolor de la vesícula y fiebre.

6 Qué evitar durante el tratamiento

No tomes alcohol en exceso porque aumenta el riesgo de azúcar baja.

No te automediques con otros tratamientos.

No conduzcas si sientes mareo o debilidad.

No usar durante el embarazo, cirugía de cualquier tipo o complicaciones médicas.